

Date

Identification / Race

Poids /âge

l'opérateur est ostéopathe

oui

non

l'opérateur fait aussi le soin

oui

non

Motif de consultation

Traitement

Entourez le contexte\*

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

autre mesure \*\*

1	2	3

1	2	3

1	2	3

1	2	3

1	2	3

1	2	3

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

1	2	3

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

1	2	3

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

1	2	3

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

1	2	3

temps	opérateur	1	2	3	4	5	6

1	2	3

\*

- A- répétabilité intraopérateur de la mesure : faire 5 à dix mesures consécutives sur un même animal, à chaque fois défaire le ruban et recommencer. noter toutes les mesures.
- B- répétabilité interopérateur : idem, même cheval, même nombre de mesures par opérateur, X opérateurs. Tout noter etc...
- C- Mesure de l'hélice droite et de l'hélice gauche pour voir si les deux subissent les mêmes variations
- D- Un même animal sur le cycle de la journée : mesure toutes les heures pour voir si cela change au cours de la journée faire si possible plusieurs jours de rang sur un même animal qui ne sera traité en aucune façon ni soumis à aucun stress (chaque mesure est prise trois fois, les trois résultats sont notés). Le plus d'animaux possibles dans ce lot.
- E- Mesure de votre animal le plus souvent possible (plusieurs mois ?) en notant tout, pour voir si il y a variation au cours du temps et quand....  
si c'est un chien, prendre le poids en même temps...
- F- Des animaux en consultations classiques par un non ostéopathe, il faut en plus bien noter le traitement qui a été fait et le motif de consultation.  
Mesurer avant, aussitôt après et si possible quelques fois de plus à dix minutes d'intervalles, chaque mesure est refaite trois fois, les trois résultats sont notés.
- G- Des animaux en consultation d'ostéopathie. Avant et aussitôt après. Puis toutes les dix minutes ( le plus longtemps possible !!)  
si vous en avez l'occasion, car il convient de comprendre la dynamique de la modification qui est assez rapide....
- H- Si vous prescrivez : fleur de bach, homéopathie, ou une consultation d'acupuncture, avec ou sans ostéo faites de même. Mesurez avant la consult, après, puis après avoir donné le remède, attention attendez vous à des variations instantanées énormes !!!! multipliez les mesures, si entre deux mesures consécutives vous trouvez des variations importantes.
- I- prendre les mesures des trois endroits où le ruban passe sur le plan sagittal avant et après un traitement ostéopathique pour déterminer quelle partie du corps subit le plus de variations.
- J- comparer avec d'autres mesures corporelles : hauteur au garrot, diamètre thoracique (tour du thorax juste derrière le garrot, etc...

\*\*

hauteur au garrot  
diamètre thoracique